

Isoniazida (oral)

Información sobre el medicamento

La ISONIAZIDA (eye-soe-NYE-a-zid, pronunciación en inglés) se utiliza para la prevención o el tratamiento de la tuberculosis (TB).

Informe a su médico, enfermera farmacéutico si:

- sufre de alergias;
- está embarazada o planea quedar embarazada;
- está amamantando a un bebé;
- toma algún otro medicamento recetado, entre otros, píldoras anticonceptivas y diluyentes de la sangre;
- toma cualquier medicamento de venta libre, tales como medicamentos para el resfrío y calmantes (Tylenol[®], Advil[®], Motrin[®], aspirina);
- sufre algún otro problema médico, como enfermedades hepáticas o consume alcohol.

Tome este medicamento:

- exactamente como se lo indicó su médico y NO deje de hacerlo hasta que se lo indiquen, aun cuando se sienta mejor;
- con alimentos o antiácidos si le produce malestar estomacal. Asegúrese de que el antiácido NO contenga aluminio. Solicite ayuda a su farmacéutico o enfermera si no está seguro.

ADVERTENCIA:

- Probablemente su médico le pida que tome piridoxina (vitamina B6) junto con este medicamento para ayudar a prevenir o disminuir algunos efectos secundarios.
- Llame a su médico si tiene tos, sibilancias, intolerancia al ejercicio, asma inducida por el ejercicio, reducción de la función pulmonar, aumento de esputo NO causado por ninguna enfermedad o padecimiento específico.
- En pacientes diabéticos, puede dar lugar a resultados erróneos en los análisis de azúcar en sangre de orina. NO cambie su dieta ni la dosis del medicamento para la diabetes sin consultar a un profesional.
- Se recomienda que restrinja el consumo de alimentos tales como quesos estacionados y pescado enlatado o en escabeche mientras esté bajo tratamiento con isoniazida. Llame a su médico si su presión arterial aumenta o si siente rubor, sudoración, mareos, palpitaciones dolores de cabeza, escalofríos o diarrea.
- No se olvide de ninguna dosis. Si se olvida de una, tómela tan pronto como pueda. Saltee la dosis olvidada si es casi el horario de la dosis siguiente programada. NO tome dos dosis al mismo tiempo.
- No comparta el medicamento con otros.

- Restrinja el consumo de bebidas alcohólicas mientras esté tomando este medicamento para evitar posibles problemas hepáticos. Además, el alcohol puede impedir que este medicamento actúe adecuadamente.
- Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.
- Visite a su médico periódicamente.
- Guarde el medicamento en un lugar seco y fresco, alejado del frío o calor extremo.
- Si cree haber ingerido una sobredosis de este medicamento, consulte a su médico.

Los posibles efectos secundarios de este medicamento son, entre otros:

- diarrea
- dolor estomacal

Llame a su médico si presenta alguno de los siguientes efectos secundarios POCO COMUNES :

- torpeza o inestabilidad al caminar
- orina de color oscuro
- náuseas, vómito o pérdida del apetito
- entumecimiento, hormigueo, ardor o dolor en las manos o pies
- cansancio o debilidad inusual
- color amarillento de los ojos o la piel
- visión borrosa o pérdida de la visión con sin dolor ocular
- convulsiones
- fiebre y dolor de garganta
- dolor articular
- cambios de estado de ánimo u otros cambios psicológicos
- erupción cutánea
- magulladuras o sangrado inusual

Reproducido, con autorización, de la United States Pharmacopeial Convention, Inc., 1989-2003. Impreso en marzo de 2003 por la University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority, Madison, WI. Revisado por el Department of Pharmacy. UWH #4468.